


Q2 Conosci i Risultati del Trial COMPASS?


Answered: 410 Skipped: 8



ANSWER CHOICES	RESPONSES	
si	84.88%	348
no	15.12%	62
TOTAL		410

Q3 Ritieni che i dati del Trial COMPASS potranno modificare la pratica clinica?


Answered: 411 Skipped: 7



ANSWER CHOICES	RESPONSES	
molto	8.76%	36
abbastanza	51.58%	212
poco	34.55%	142
per nulla	5.11%	21
TOTAL		411

Q4 E' indicato in lettera di dimissione un percorso di follow-up per il paziente trattato con PCI?


Answered: 411 Skipped: 7



ANSWER CHOICES	RESPONSES	
sempre	61.80%	254
spesso	27.74%	114
raramente	9.00%	37
mai	1.46%	6
TOTAL		411

Q5 E' indicato in lettera di dimissione il profilo di rischio ischemico/coronarico (anatomia coronarica, rivascolarizzazione completa) del paziente?


Answered: 411 Skipped: 7



ANSWER CHOICES	RESPONSES	
sempre	40.15%	165
spesso	32.85%	135
raramente	21.41%	88
mai	5.60%	23
TOTAL		411

Q6 Nelle vostre strutture di riferimento esistono ambulatori dedicati al paziente rivascolarizzato?


Answered: 409 Skipped: 9



ANSWER CHOICES	RESPONSES	
si	64.55%	264
no	35.45%	145
TOTAL		409

Q7 Nelle vostre strutture di riferimento esistono ambulatori dedicati al paziente post SCA?


Answered: 409 Skipped: 9



ANSWER CHOICES	RESPONSES	
si	62.10%	254
no	37.90%	155
TOTAL		409

Q8 Gestisci personalmente il follow-up del paziente con cardiopatia ischemica cronica?


Answered: 409 Skipped: 9



ANSWER CHOICES	RESPONSES	
si	52.57%	215
no	47.43%	194
TOTAL		409

Q9 Nel paziente asintomatico sottoposto a procedure di rivascolarizzazione ogni quanto esegui/richiedi visita cardiologica + ECG?


Answered: 409 Skipped: 9



ANSWER CHOICES	RESPONSES	
ogni 6 mesi	25.43%	104
12 mesi	65.28%	267
24 mesi	2.20%	9
solo se ripresa di sintomi	7.09%	29
TOTAL		409

Q10 Quale terapia antitrombotica ritenete avere maggiori evidenze a lungo termine nel paziente con CAD?


Answered: 409 Skipped: 9



ANSWER CHOICES	RESPONSES	
Asprina soltanto	36.92%	151
DAPT con clopidogrel	13.69%	56
DAPT con Ticagrelor 60 mg	33.99%	139
Asprina + Rivaroxaban 2.5 mg BID	14.43%	59
DAPT + Rivaroxaban 2.5 mg BID	0.98%	4
TOTAL		409

Q11 La terapia con Rivaroxaban 2.5 BID dopo quanto tempo dalla PCI dovrebbe essere aggiunta?


Answered: 408 Skipped: 10



ANSWER CHOICES	RESPONSES	
al 12 mese	50.25%	205
24 mesi	2.70%	11
in qualunque punto di follow-up dopo più di 12 mesi	47.06%	192
TOTAL		408

Q12 In quale percentuale di pazienti trattati con PCI pensi che utilizzerai Rivaroxaban 2.5 mg BID nel follow-up a lungo termine?


Answered: 409 Skipped: 9



ANSWER CHOICES	RESPONSES
<20%	62.84% 257
20-40%	31.30% 128
40-65%	3.91% 16
65-80%	1.47% 6
>80%	0.49% 2
TOTAL	409

Q13 Quale terapia antitrombotica ritenete avere maggiori evidenze a lungo termine nel paziente con PAD?


Answered: 408 Skipped: 10



ANSWER CHOICES	RESPONSES	
Asprina soltanto	27.45%	112
DAPT con clopidogrel	25.25%	103
DAPT con Ticagrelor 60 mg	12.25%	50
Asprina + Rivaroxaban 2.5 mg BID	32.11%	131
DAPT + Rivaroxaban 2.5 mg BID	2.94%	12
TOTAL		408

Q14 Nel paziente con sindrome coronarica acuta quale terapia antitrombotica prescrivi più frequentemente alla dimissione?


Answered: 409 Skipped: 9



ANSWER CHOICES	RESPONSES	
asa + clopidogrel	5.62%	23
asa+ticagrelor	91.69%	375
asa+prasugrel	2.20%	9
solo asa	0.49%	2
TOTAL		409

Q15 Nel paziente con sindrome coronarica acuta e diabete mellito quale terapia antiaggregante prescrivi più frequentemente alla dimissione?


Answered: 409 Skipped: 9



ANSWER CHOICES	RESPONSES
asa + clopidogrel	3.18% 13
asa+ticagrelor	84.11% 344
asa+prasugrel	12.47% 51
solo asa	0.24% 1
TOTAL	409

Q16 In quale percentuale di pazienti diabetici trattati con PCI pensi che utilizzerai Rivaroxaban 2.5 mg BID nel follow-up a lungo termine?


Answered: 409 Skipped: 9



ANSWER CHOICES	RESPONSES	
<20%	56.97%	233
20-40%	27.14%	111
40-65%	12.96%	53
65-80%	1.96%	8
>80%	0.98%	4
TOTAL		409

Q17 In quale percentuale di pazienti multivasali trattati con PCI pensi che utilizzerai Rivaroxaban 2.5 mg BID nel follow-up a lungo termine?


Answered: 408 Skipped: 10



ANSWER CHOICES	RESPONSES
<20%	56.86% 232
20-40%	29.66% 121
40-65%	11.03% 45
65-80%	1.23% 5
>80%	1.23% 5
TOTAL	408

Q18 In quale percentuale di pazienti con pregressa SCA pensi che utilizzerai Rivaroxaban 2.5 mg BID nel follow-up a lungo termine?

Answered: 409 Skipped: 9



ANSWER CHOICES	RESPONSES	
<20%	65.77%	269
20-40%	23.96%	98
40-65%	8.07%	33
65-80%	1.47%	6
>80%	0.73%	3
TOTAL		409